# Municipalité de Saint-Noël, Québec

L'eau et les changements climatiques: Maintenir une cohabitation durable





Cahier des Élus

| Table des matières  |            |
|---|------------|
|   | Page       |
| La vision du cahier                                       | <u>3</u>   |
| Rôle de l'OBVMR   | <u>4</u>   |
| Le bassin versant Matapédia-Restigouche                   | <u>5</u>   |
| Le Plan Directeur de l'Eau                                | 22         |
| Votre municipalité  | 23         |
| Eau potable   | <u>25</u>  |
| Eau souterraine.  | <u> 26</u> |
| Eaux usées  |            |
| Développement en zone habitée                             | <u>32</u>  |
| Gestion de l'eau de ruissellement                         | <u>36</u>  |
| Biodiversité  | 44         |
| Changements climatiques.                                  | <u>53</u>  |
| Cohabitation avec les milieux aquatiques: forces et défis |            |
| PDE: problématiques prioritaires et leurs orientations    | 55         |

### Équipe de projet

### Réalisation:

Organisme de Bassin Versant Matapédia-Restigouche Renaud Beaucher-Perras: Collecte de données et rédaction Louise Beaupré: Collecte de données et rédaction Mireille Chalifour: Terrain, analyse, révision, géomatique Jany-May Charest: Terrain, rédaction Rebecca Gagnon: Suivi environnemental Mathieu Simard: Géomatique, rédaction

Merci à l'OBVNEBSL pour le partage de données du lac Michaud.

Le contenu de ce document n'engage que ses auteurs.

### Nous tenons à remercier nos partenaires du projet!

- Fondation de la Faune du Québec (partie portrait)
- Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
- Municipalité de Saint-Noël



## La vision du cahier

### Votre Plan Directeur de l'Eau personnalisé

Vous faites parties des municipalités privilégiées: vous cohabitez avec une biodiversité indicatrice d'un milieu naturel en santé.

Ce cahier est basé sur le Plan Directeur de l'Eau (PDE), mais va beaucoup plus loin et en détail. Il s'agit de votre PDE personnalisé, il vise directement le territoire de votre municipalité, et ce dans un unique document. Vous pouvez consulter la version globale du PDE au <a href="https://www.matapediarestigouche.org">www.matapediarestigouche.org</a>.

Tout ce qui touche l'eau des municipalités à l'amont (de l'A MONTagne) (ruissellement, pollution, sédimentation, etc.) se répercute à l'aval (vers l'A VALlée). Pour les municipalités à la tête de bassins versants, il s'agit d'une occasion en or de protéger la ressource plus largement. Par conséquent, les municipalités à l'amont ont un impact direct sur les municipalités à l'aval. La collaboration devient un élément primordial pour l'adaptation aux changements climatiques. Presque la totalité des municipalités du bassin versant ont maintenant leur cahier personnalisé. Vous pouvez les consulter au www.matapediarestigouche.org/cahiers-des-elus.

### Plusieurs orientations du PDE ont un lien direct avec ce cahier:

20.02: Améliorer les connaissances de l'état des

écosystèmes aquatiques.

**20.03:** Optimiser les fonctions écologiques des MHH pour

le bassin versant Matapédia-Restigouche

20.05: Réduire l'impact des milieux habités sur les milieux

humides et hydriques pour le bassin versant

Matapédia-Restigouche

**20.18:** Maintenir les refuges thermiques aquatiques pour

les espèces bioindicatrices de la qualité de l'eau que

sont les salmonidés

**50.02:** Créer un lien d'appartenance et de cohabitation

durable avec les plans d'eau

# e e

### Objectifs du cahier

- Transmettre aux intervenants municipaux un document de référence sur l'eau dans leur territoire municipal pour faciliter une gouvernance et une gestion durable de l'eau, et ce afin de se mobiliser à l'action
- 6 Expliquer les impacts des zones habitées sur la qualité des habitats aquatiques
- Comprendre le rôle écologique des municipalités vivant en hauteur, loin des rivières à saumon, en tant que gardiennes des réserves d'eau froide
- Maintenir la pérennité des habitats aquatiques par une cohabitation durable avec les zones habitées

«Pour prendre des décisions éclairées et efficaces au sujet de la protection des salmonidés et des habitats aquatiques, les décideurs doivent avoir accès à l'information pertinente générée et basée sur les conditions locales».

3

### Rôle de l'Organisme de bassin versant

### Politique Nationale de l'Eau


En 2002, pour la première fois de son histoire, le Québec s'est doté d'une Politique Nationale de l'Eau (PNE). Celle-ci lui a permis de mettre en place la gestion intégrée de l'eau par bassin versant afin d'assurer la protection de l'eau, de mieux protéger la santé publique et celle des écosystèmes, et de gérer l'eau dans une perspective de développement durable.

Le 28 avril 2003, dans la foulée de l'application de cette politique, sous l'initiative de la Corporation de Gestion des Rivières Matapédia et Patapédia et différents acteurs du milieu, le Conseil de bassin versant de la rivière Matapédia (CBVRM) est créé et son siège établi à Causapscal. Le CBVMR faisait partie des 32 organismes de bassin versant de la première phase de la PNE. En 2008, le ministère enclenche la deuxième phase et découpe le Québec méridional en zones de gestion intégrée de l'eau pour inclure la partie québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche. Le CBVRM, en concertation avec le milieu, modifie son nom pour devenir l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR).

### Des organismes de bassin versants partout dans le Québec méridional

L'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche est l'un des 40 organismes de bassin versant reconnus par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Sa mission est de promouvoir la gestion intégrée de l'eau de la partie québécoise du bassin versant de la rivière Ristigouche en concertation avec les acteurs du milieu.

Le principal mandat de l'OBVMR est de réaliser le Plan Directeur de l'Eau (PDE), qui permet de guider les actions à mener pour gérer l'eau dans une perspective de développement durable. Afin de favoriser la mobilisation des acteurs de l'eau, l'OBVMR a opté pour une élaboration participative du PDE. Ainsi, les acteurs de l'eau siègent sur la table de concertation de l'OBVMR qui est structurée de manière à mettre à profit le temps donné par les intervenants clés et les experts de la zone de gouvernance.




### Le bassin versant de la rivière Ristigouche

Le bassin versant de la rivière Ristigouche, d'une superficie de 12 780 km², se situe à l'extrémité ouest de la péninsule gaspésienne. Il est localisé à la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick: 48,6 % du bassin versant est situé sur le territoire québécois et 51,4 % est situé sur le territoire néo-brunswickois.

Il fait partie de la région hydrographique de la Baie des Chaleurs et de Percé. Le bassin versant recoupe les régions administratives du Bas-Saint-Laurent (65 %) et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (35 %).


| Proportion de superficie couverte par MRC |     |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|
| MRC de La Matapédia 52 %                  |     |  |  |  |  |
| MRC d'Avignon 35 %                        |     |  |  |  |  |
| MRC de La Mitis                           | 8 % |  |  |  |  |
| MRC de Rimouski-Neigette 4 %              |     |  |  |  |  |
| MRC de La Matanie                         | 1 % |  |  |  |  |




MRC (QC) et comtés (NB) du bassin versant de la rivière Ristigouche


### Les grands sous bassins versants de la rivière Ristigouche

Le grand sous bassin de la rivière Matapédia est situé entièrement au Québec tandis que celui de la rivière Upsalquitch est entièrement au Nouveau-Brunswick. Les trois autres sont partagés entre les deux provinces.





### Répartition de la population par municipalité dans le bassin versant de la rivière Ristigouche



### Répartition de la population dans le bassin versant:

- 22 900 citoyens au Québec
- 21 370 citoyens au Nouveau-Brunswick

### Au Québec:

- 33 municipalités
- 11 TNO (Territoires non organisés)
- Une communauté autochtone de la nation Mi'gmaq, Listuguj

La présence humaine sur le territoire, par l'urbanisation et la modification de l'environnement, entraîne différentes pressions anthropiques sur les plans d'eau:

- Augmentation du ruissellement vers les cours d'eau; manque de bassins de sédimentation à la sortie des fossés de routes, imperméabilisation du sol (surfaces pavées) en milieu urbain près de la rivière.
- Risques de contamination d'origine industrielle, chimique et/ou organique; pollution historique fortement reliée aux scieries, dépôts de sciure de bois.
- Remblai de zones humides ou inondables.
- Risques d'inondations.
- Activités récréotouristiques; causes possibles de fuites d'hydrocarbure, d'introduction d'espèces exotiques envahissantes, d'impacts généraux sur l'habitat du poisson, transformation des résidences secondaires riveraines en résidences permanentes.
- Problématiques reliées au traitement des eaux usées; présence d'installations septiques désuètes près des rives et de la nappe phréatique.


### Les sous bassins versants de la Matapédia-Ristigouche

### La Matapédia est le plus grand des sous bassins versants

| Grands sous bassins                 | Superficie          |
|-------------------------------------|---------------------|
| Sous bassin de la rivière Matapédia | 3796 km²            |
| Sous bassin de la rivière Patapédia | $782 \text{ km}^2$  |
| Sous bassin de la rivière Escuminac | $323 \text{ km}^2$  |
| Sous bassin Kedgwick                | $306 \text{ km}^2$  |
| Sous bassin Kempt                   | 260 km <sup>2</sup> |
| Sous bassin Ferguson                | $135 \text{ km}^2$  |
| Sous bassin Chaîne de Roches        | $108 \text{ km}^2$  |
|                                     |                     |

Le bassin versant de la rivière Matapédia peut être divisé en 14 sous bassins secondaires. Ces sous bassins sont dotés de caractéristiques distinctes, telles que la superficie, la longueur du réseau hydrographique, la superficie occupée par les lacs et la densité de drainage anthropique.

En tout, le bassin versant comporte 110 lacs avec un toponyme officiel. Toutefois, le territoire est parsemé d'environ 500 autres lacs n'ayant pas de nom, qui, additionnés aux autres, composent 1,65 % de la superficie du bassin versant.



Sous bassin versant de la rivière Matapédia

### Les sous bassins versants de la rivière Ristigouche



Sous bassins versants de la rivière Ristigouche

23 sous bassins versants sur 27 ont moins de 100 km<sup>2</sup>

Le secteur Ristigouche aval comprend 14 petits sous bassins qui se jettent directement dans l'estuaire de la rivière Ristigouche. Douze font moins de 50 km² et huit d'entre eux font moins de 20 km². Les sous bassins versants de la rivière Kempt et de la rivière Escuminac sont les plus grands et couvrent respectivement 260 et 323 km².

On y retrouve au total 123 lacs, dont 109 font moins de 1 hectare. Les plus grands sont les lacs Dubé, Glenn et des Capucins avec des superficies respectives de 7, 9 et 9.5 ha.

La rivière Escuminac est reconnue pour la présence de l'omble de fontaine anadrome, communément appelée truite de mer. Plusieurs fosses y sont présentes.

### Estuaire de la Ristigouche - Faits saillants

### **Pressions humaines**

- Navigation commerciale;
- Aménagement artificiel des rives;
- Réseaux routiers et ferroviaires;
- Activités industrielles:
- Pollution indirecte du rejet des eaux usées;
- Circulation en véhicules motorisés dans les milieux humides:
- Activités forestières;
- Augmentation de la déposition de matériaux (sédiments) transportés par les rivières jusqu'aux embouchures menant à des problèmes d' écoulement ou de circulation des poissons (ex: saumon et truite de mer);
- Dégradation de l'habitat du poisson par l'apport de sédiments fins (ex: frayères de salmonidés);
- Déboisement de terres adjacentes aux milieux humides;
- Risques de destruction des milieux humides et réduction de la diversité faunique et floristique.

### **Biodiversité**


- Plusieurs milieux humides exceptionnels;
- Lieux de refuge d'oiseaux migrateurs.

### Dynamique des cours d'eau

- Cours d'eau en tresses en aval de l'embouchure de la rivière Matapédia;
- La moyenne annuelle d'eau douce reçue par la baie est de 730m³/ s;
- Rive Nord (Qc): entrée d'eau salée et froide provenant de l'embranchement du courant de Gaspé;
- Rive Sud (NB): sortie d'eau moins salée et plus chaude en surface provenant d'un mélange d'eau douce des rivières avec les eaux marines de la baie.

### **Changements climatiques**

- Augmentation du niveau de la mer estimée à plusieurs centimètres au cours du dernier siècle, cette tendance se maintient;
- Diminution de la formation de glaces qui protègent les berges et les milieux humides des vagues et des vents;
- Forte érosion de la côte nécessitant des protections lourdes pour maintenir les infrastructures (ex: rte 132).



### Migration d'espèces fauniques importantes

### Poissons pêchés:


- Saumon atlantique: présent dans la majorité des rivières du bassin versant:
- Omble de fontaine: présente à la grandeur du territoire, souvent en population anadrome s'engraisser en eau salée avant de revenir frayer en eau douce), comme dans les rivières Nouvelle, Ristigouche et Matapédia;
- Truite arc-en-ciel: espèce introduite dont les mentions de capture augmentent dans la Nouvelle et la Matapédia;
- <u>Éperlan arc-en-ciel</u>: pêche hivernale sur la glace dans l'estuaire de la rivière Ristigouche; présence de frayères dans la plupart des rivières se jetant directement à la mer (exploitation commerciale hivernale l'estuaire dans de Restigouche);
- Pêche autochtone de subsistance à l'embouchure de Restigouche;
- Présence de l'anquille d'Amérique, une espèce en situation précaire à la grandeur du territoire;
- Présence de poulamon atlantique, de bar rayé, de plie lisse et rouge, de gaspareau et d'alose savoureuse (estuaire de la Ristigouche), de jusqu'à Miguasha), de hareng et de morue (pointe de Miguasha).

Charlotte Raleigh

Jacksonville

Orlando ampa

Miami



Hayana

- 1- Découverte, Radio Canada, 2016 ( <a href="http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/774454/anguilles-amerique-bassin-saint-laurent-menacee">http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/774454/anguilles-amerique-bassin-saint-laurent-menacee</a>) 2- COSEPAC. 2010. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le saumon atlantique au Canada

1 000 Kilomètres

Mer des Sargasses

3- MPO. 2015. Recheational fishery catches, spawner abundance, and biological characteristics of striped bass (morone saxatilis) in the southern gulf of St.Lawrence in 2014)

### Contexte historique autour de la Baie des Chaleurs

Territoire occupé traditionnellement de manière nomade par les Mi'gmaq: ils se déplaçaient via les principales rivières au gré des saisons pour suivre leurs sources d'alimentation. L'abondance d'éperlans, gaspereaux, esturgeons, saumons, anguilles et poulamons dans la baie des Chaleurs et dans l'estuaire des rivières à saumon ont permis une semi-sédentarisation. De plus, si la chasse n'avait pas été fructueuse durant l'automne, la baie offrait quelques pêches tardives avant le gel des cours d'eau et la viande des phoques qui permettaient de subsister durant lhiver.



À partir de la renaissance, la baie des Chaleurs est le théâtre de nombreux échanges entre autochtones, migrants et flottes commerciales européennes (qui s'approvisionnaient ici en poissons et fourrures).

Fin 18<sup>e</sup> siècle, après la guerre de 7 ans (où de nombreux conflits se sont déroulés dans la baie des Chaleurs), les français quittent la baie, laissant place aux pêcheries commerciales anglo-saxonnes. L' économie de la Gaspésie est alors axée sur la pêche à la morue, et le déboisement est amorcé afin de construire bateaux et bâtiments. Un vif intérêt est aussi porté au saumon (John Shoolbred établira un comptoir sur la rivière Ristigouche) qui sera alors pêché en quantités faramineuses.

L'arrivée massive de pionniers, d'expatriés loyalistes américains et l'explosion démographique ont ensuite entraîné le défrichement des terres les plus fertiles pour l'agriculture et la vente du bois. Cette déforestation massive a eu de nombreux impacts sur les rivières (perte de rôle tampon des forêts, érosion des berges, pratique de la drave, réchauffement de l'eau).



Matthew Farfan collection



En 1820, la pêche au saumon est interdite durant la fraie. S'ensuivent de nombreuses lois visants à protéger le stock de saumons (législation des techniques de pêche, dates des saisons de pêche, mise en place de passes à poissons, interdiction d'obstruer les cours d'eaux). On remarque en effet rapidement une baisse du stock de saumons dans les rivières, imputée tant à la pêche commerciale qu'à la colonisation et à l'essor du secteur forestier.

Au 19<sup>e</sup> siècle commence la pêche sportive et naissent les "clubs privés" qui seront remplacés dès 1970 par des corporation de gestion, rendant les rivières accessibles à tous. Il s'ensuit une prise en charge locale et concertée de la ressource en saumon, ainsi la Corporation de Gestion des Rivières Matapédia et Patapédia est mandatée par le gouvernement en 1993. La pêche commerciale du saumon dans la baie des Chaleurs prend fin en 1972.





En 1876, le chemin Kempt est refait, en 1911, la voie ferroviaire relie Matapédia à Gaspé, desservant toute la baie des Chaleurs, puis la route 132 est construite en 1920 (même s'il faudra attendre 1950 pour y circuler durant l'hiver). Ces nouveaux axes de communication vont permettre la naissance d'une grande partie des municipalités de la vallée de la Matapédia, une hausse de la population qaspésienne et le développement accru du secteur forestier (Bowater sur la Ristigouche).

En 1966, la fonderie Noranda voit le jour à Belledune (NB) suivie par le port de Belledune en 1968, connecté au chemin de fer. Un projet de port pétrolier sème la controverse dans le milieu pour sa potentielle ouverture à des cargos internationaux ouvrant la porte aux espèces exotiques envahissantes.

À Atholville, la papetière entre en fonction en 1988: les effluents de l'industrie réchauffent l'eau de la baie empêchant la glace de se former en hiver à la sortie de son effluent.

Présentement en moratoire au Québec, les secteurs de Ristigouche et de la Baie des Chaleurs sont dans l'oeil des compagnie minières d'uranium.


En 2013, la pétrolière Gastem réclame 1,5 million\$ aux 168 habitants de Ristigouche Sud-Est pour avoir voulu protéger leur eau potable.

Prendre note que les compagnies pétrolières ont des titres jusque dans le lit de la rivière Ristiqouche.





# "Si nous voulons être les acteurs responsables de notre bassin versant, nous avons d'abord un devoir de le connaître" -OBVMR




### Notre bassin versant: eau et biodiversité, des richesses à protéger

Notre paysage a été façonné par le mouvement des glaciers et de l'eau. D'énormes glaciers, en se déplaçant, ont aplani les montagnes, créé des vallées, laissé çà et là des sols de types différents et d'épaisseurs variables ainsi qu'un grand lac. La dépression au sud du lac Matapédia est un riche héritage pour la biodiversité, car elle offre les terres des plus fertiles et favorise la formation de milieux humides. La terre de couleur noire est indicatrice de milieux humides. Souvent un lien peut être fait avec l'emplacement de l'ancien fond du lac Matapédia qui arrivait, il y a 13 000 ans, 85 mètres plus haut qu'aujourd'hui.

Ces dépôts meubles sur le territoire favorisent d'importantes quantités d'eau souterraine. Toutefois, la qualité de cette eau est fragile puisque le sol (principalement sableux), bien qu'il soit idéal pour recharger l'aquifère, permet aussi très facilement l'infiltration de contaminants!

### Le fonctionnement de la nappe phréatique

L'eau souterraine est une composante importante du cycle hydrologique. Elle provient des précipitations, s'infiltre dans le sol et circule verticalement jusqu'à la nappe phréatique, puis se déplace vers les cours d'eau situés en aval. En remplissant complètement les interstices d'un terrain poreux et perméable appelé l'aquifère, à faible profondeur, l'eau souterraine constitue la nappe phréatique. Elle représente généralement une excellente source d'approvisionnement en eau potable, car le filtre naturel constitué par les matériaux géologiques et par la végétation produit, le plus souvent, une eau de grande qualité.



### Les milieux humides

### Zones de transition entre les écosystèmes terrestres et aquatiques!

Un milieu humide se définit comme étant un terrain où la nappe phréatique est à proximité ou au-dessus de la surface, ou qui est saturé d'eau assez longtemps pour créer des conditions comme des sols modifiés par l'eau et une végétation hydrophile. Certains milieux humides retiennent l'eau pendant toute l'année, alors que d'autres la retiennent pendant un ou deux mois tous les printemps. Nous avons résumé ici les grandes classes de milieux humides:



**Marécage:** Milieu dominé par les arbres et les arbustes, soumis à des inondations saisonnières causées par la crue printanière ou sur un site avec une nappe phréatique élevée. Le sol est généralement minéral.

Dans les Appalaches, 23% des milieux humides classifiés seraient des marécages.



**Étang:** Zone d'eau libre où la végétation occupe moins de 25% du couvert et où la profondeur de l'eau est de moins de 2 m.

Dans les Appalaches, on observe plusieurs petits lacs de tête qui s'apparentent à de grands étangs.

**Marais:** Site dominé par les plantes herbacées, pouvant être complètement ou en partie couvert d'eau pendant la belle saison. On les retrouve souvent en bordure des cours d'eau ou des lacs. Les prairies humides et les herbiers aquatiques sont des types de marais.

Dans les Appalaches, 5% des milieux humides classifiés seraient des marais.





**Tourbière:** Dépression où les conditions de drainage font qu'au fil des siècles, les débris végétaux se sont accumulés pour former une épaisse couche de tourbe. Une tourbière prend des milliers d'années à se former et la végétation qui s'y trouve est principalement composée d'arbustes et d'arbres.

Dans les Appalaches, 64% des milieux humides classifiés seraient des tourbières.

Les milieux humides ont des fonctions écologiques importantes pour le milieu habité et agricole, d'autant plus face aux changements climatiques où les étiages sévères et les crues soudaines seront plus fréquentes. Ils agissent comme un réservoir et réduisent l'ampleur des inondations des terres, rechargent les nappes phréatiques et ré-alimentent d'eau fraîche les cours d'eau durant les étiages sévères. Ceux-ci sont quelques services écologiques que les milieux humides nous donnent.

### Les milieux humides du bassin versant risquent de disparaître sans être connus

Selon Canards Illimités, il est estimé que le bassin versant de la rivière Ristigouche contient 2918 ha de milieux humides qui représentent 0,46% du territoire. 21 % de ces milieux humides sont classifiés comme herbiers aquatiques (607 ha), 26 % comme marais (sorties de la rivière du Loup, du ruisseau Ferguson et de la rivière Escuminac) et 53 % sont non classifiés (1546 ha). Seulement le secteur d'Amqui et le sud du lac Matapédia ont une cartographie plus détaillée des humides, et ce, depuis seulement 2016 (rapport CIC Amqui). Il y a un manque de connaissance rendant totalement vulnérables au développement urbain les milieux humides.

C'est principalement dans les milieux humides que l'on retrouve les espèces végétales menacées ou désignées vulnérables répertoriées dans le bassin versant, comme l'Aster d'Anticosti, la Sagittaire des estuaires, la Ptérospore à fleurs d'Andromède, l'Asaret gingembre, le Lis du Canada, la Matteucie fougère-à-l'autruche, la Sanguinaire du Canada ainsi que la Valériane des tourbières.

### Du défrichement à la colonisation

Au 20<sup>e</sup> siècle, le Bas-Saint-Laurent était reconnu comme un grand producteur de bardeaux de cèdre. Les cédrières se développent dans des zones où le sol est mal drainé, c'est-à-dire dans les terres où l'eau reste plus longtemps. Or, l'intérêt économique de cette essence forestière, située dans l'axe de colonisation de la vallée, a favorisé le défrichement de forêts particulièrement abondantes au sud du lac Matapédia. Les fonctions écologiques de ces milieux humides ont été affectées, tel que perte de rétention de l'eau, filtration et apport d'eau froide pour l'été.

Ensuite, plusieurs zones habitées et agricoles ont connu des inondations. Il y plusieurs 50 ans. ouvrages d'importance de drainage, linéarisation (avec des gabions de bois et de roches) ont été effectués afin d' évacuer l'eau plus rapidement vers le lac. De l'amont vers l'aval, des initiatives similaires sont observées sur les rivières Matapédia, Humqui et Ristigouche jusqu' à la Baie-des-Chaleurs. Aujourd'hui, ce sont des menaces de décrochement et d'instabilité pour des résidences riveraines et la voirie (voie ferrée et routière).

La linéarisation des cours d'eau est une solution à court terme, mais une problématique pour les générations suivantes.



Exemple de cours d'eau linéarisés

Pointe-a-la-Croix

### La liberté ou l'érosion de protestation

Les cours d'eau ne vont pas seulement de l'amont vers l'aval: ils se déplacent aussi latéralement, surtout dans les zones planes telles que celles du sud du lac Matapédia. Ils étaient donc jadis beaucoup plus sinueux. Or, lorsque la course naturelle des cours d'eau est modifiée, la vitesse d'écoulement est accélérée, augmentant la force d'érosion de l'eau sur les rives et surcreusant les ruisseaux. La stabilité des rives et la qualité des habitats en sont directement affectées. La linéarisation des cours d'eau est donc une solution à court terme, mais une problématique pour les générations suivantes. Toutefois, en redonnant un peu d'espace aux cours d'eau sur leur largeur, soit davantage de liberté, on réduira plusieurs problématiques urbaines, agricoles et écologiques! On

appelle cette approche la liberté des cours d'eau.

### Exemple de cours d'eau naturels





# L'imperméabilisation des sols urbains, le ruissellement et la sédimentation dans les cours d'eau demande une gestion durable des eaux de pluie

Nous avons grandement besoin d'une gestion à la source des sédiments et des polluants dans les eaux de ruissellement. On y retrouve le phosphore, le sel de voirie et autres polluants qui se rendent par ruissellement jusqu'à nos cours d'eau. Il s'agit d'une source de pollution considérable.

En zone urbaine, l'imperméabilisation des sols (routes, entrées pavées et toitures) et la faible présence d'arbres limitent l'infiltration de l'eau dans le sol et augmentent le ruissellement causant un débit plus élevé et plus rapide, et favorisant l'érosion des sols (scénario 1).

En condition naturelle, l'eau est retenue et absorbée par les végétaux ou s'infiltre dans le sol. Les sédiments sont alors filtrés tout au long de leur trajet jusqu'à la rivière (scénario 2).







Pour se développer, les oeufs et les alevins ont besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée. Les sédiments fins empêchent l'eau de circuler librement au travers du substrat et donc à l'oxygène d'atteindre les oeufs qui sont alors asphyxiés. L'apport urbain en sédiments fins affecte les populations de salmonidés.



L'ajout de seulement 0,5% de sédiments sur le lit des rivières diminue considérablement la viabilité des oeufs. Et avec un dépôt de 4% de sédiments fins sur le fond du cours d'eau, le taux de survie des oeufs est réduite de 80%!





### Biodiversité: Des habitats partagés avec des espèces vulnérables ou menacées à la colonisation

La diversité de peuplement forestier dans le bassin versant est attribuable au climat et à la topographie variée. Dans le sud-est, une majorité de feuillus est composée d'érablières, de bouleaux jaunes, de frênaies et peupleraies en basses-terres. Au nord-ouest, la dominance est résineuse avec des peuplements purs d'épinettes blanches et noires et des forêts mixtes: les sapinières à bouleau jaune.

Cette végétation luxuriante et les nombreuses rivières et lacs constituent un milieu de vie privilégié. Les espèces animales les mieux représentées sont l'orignal, le cerf de Virginie, l'ours noir, le lièvre d'Amérique, la gélinotte huppée et la bécasse d'Amérique en milieu terrestre. Le saumon atlantique, l'omble de fontaine et le touladi trônent dans le milieu aquatique. Enfin, le canard noir, le garrot et la bernache du Canada occupent les milieux humides.


### Les salmonidés: précieux indicateurs de bonne santé des milieux aquatiques

Comme dans peu d'endroits au Québec, nous avons la chance de retrouver dans notre région immédiate 3 espèces de salmonidés très sensibles à la dégradation de leur milieu: le touladi, l'omble de fontaine et le saumon atlantique.

Bien que leurs habitats privilégiés diffèrent, ces trois espèces ont, entre autres, des besoins en commun:

- Eau claire, leur permettant de voir leurs proies;
- Eau froide et bien oxygénée: au-dessus de 22°C, on observe des problèmes de santé importants;
- Un lieu de reproduction (frayère) composé de cailloux ou de gravier, exempt d'accumulation de sédiments et bien alimenté en eau oxygénée.





### Espèces indicatrices: une présence qui nous en dit long

### Espèce parapluie

Tel un parapluie protégeant un couple sous la pluie, la martre est une de ces espèces qui permet, lorsque l'on protège son grand territoire aux caractéristiques de vieille forêt, de protéger un grand nombre d'espèces partageant le même territoire et ayant des besoins semblables.

### Espèce clef de voûte

Telle une clef de voûte, certaines espèces de nos forêts sont indispensables pour le maintien de la biodiversité. Le grand pic, par exemple, creuse des trous dans les troncs d'arbres qui sont ensuite utilisés par différentes espèces d'oiseaux, de chauves-souris et même d'écureuils volants. Sa disparition entraîne donc des répercussions sur d'autres espèces.

### Espèce bio-indicatrice

Les salmonidés requièrent de l'eau fraîche, bien oxygénée, claire, de bonne qualité, ainsi qu'un substrat exempt de sédiments fins. Leurs besoins vitaux plus exigeants en font des espèces bio-indicatrices, c'està-dire qu'elles indiquent des habitats aquatiques de bonne qualité.

Certains macroinvertébrés benthiques (insectes, crustacés et mollusques) sont utilisés aussi comme bioindicateurs.


''Établir une cohabitation harmonieuse entre les hommes et la faune est nécessaire, la diversité est la clé du maintien de l'équilibre des écosystèmes!"

-OBVMR

### **Amphibiens et reptiles**

Mal-aimés de nos forêts, ils sont aussi grandement méconnus. Les amphibiens sont pourtant d'une grande utilité puisqu'ils contribuent, de par leur alimentation, à la régulation de la quantité d'insectes ravageurs. Très sensibles aux polluants, ils sont également des bio-indicateurs d'un écosystème en santé. Sédentaires quant à leur milieu de reproduction, ils sont très vulnérables à la dégradation de leur habitat. Également, peu d'études ont été réalisées sur les reptiles de notre région.







### Vulnérable

Aigle royal
Pygargue à tête blanche
Chauve-souris rousse de l'Est
Alose savoureuse
Éperlan arc-en-ciel
Omble chevalier oquassa

Susectible d'être désignée menacée ou vulnérable

Chauve-souris argentée
Chauve-souris cendrée
Anguille d'Amérique
Esturgeon noir

Selon le Gouvernement du Québec (Gouvernement du Québec, 2024).

### Menacée

Papillon satyre fauve des Maritimes
Martinet ramoneur
Engoulevent bois-pourri
Goglu des prés
Grive de Bicknell
Grive des bois
Paruline du Canada
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Sturnelle des prés

Pipistrelle de l'Est Tortue des bois

### Préocupante

Arlequin plongeur (popu. de l'Est)
Faucon pèlerin
Engoulevent d'Amérique
Gros-bec errant
Hibou des marais
Râle jaune
Moucherolle à côté olive
Carcajou

### En voie de disparition

Chauve-souris nordique Petite chauve-souris brune Grenouille léopard

Selon la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) du Gouvernement du Canada (L.C. 2002, ch. 29).

La population de **saumon atlantique** de la
Gaspésie-sud du golfe
Saint-Laurent fait partie des **espèces préoccupantes**selon la COSEPAC
(COSEPAC. 2010).





### CASTOR: Les défis reliés au castor?

Malgré les dommages causés, le castor est l'une de nos espèces fauniques les plus précieuses! Il contribue à la création de terres humides favorisant l'habitat d'une panoplies d'espèces:

- Leurs étangs sont d'une grande importance pour la sauvagine, le succès de nidification y est élevé (faible prédation);
- Les densités d'oiseaux y ont été estimées à trois fois supérieures;
- Les étangs fournissent des plantes aquatiques essentielles à l'alimentation de l'orignal;
- Les barrages créent un bassin de sédimentation naturelle.

Une quantité innombrable de plantes, reptiles, amphibiens, d'insectes, poissons et mammifères seraient absents autrement!




La **cohabitation** avec le castor est un réel défi. Plusieurs dommages sont reliés au castor:

- Dommages aux réseaux routiers, sentiers et infrastructures:
- Obstruction de ponceaux;
- Inondation de superficies forestières ou agricoles;
- Menace à la sécurité publique;
- Entrave à la circulation du poisson.

Bien que parfois la meilleure des solutions reste le déplacement ou le piégeage de la colonie, beaucoup de cas peuvent être avantageusement résolus par l'utilisation de méthodes préventives que ce soit sur le plan des coûts, de l'efficacité ou des avantages fauniques.

### Qu'est ce qu'est la déprédation?

"Lorsqu'un animal cause des dommages matériels à des biens, on dit qu'il y a déprédation."



### Habitat favorable à l'établissement du castor:

- Attirance marquée pour certaines essences d'arbres: peupliers, bouleaux à papier et aulnes saules;
- Arbres de moins de 20 cm;
- Dénivellation de moins de 15%.

Les ponceaux sur des terrains à pente réduite (1 à 5 %), peuplés de feuillus sont des sites idéaux.

### L'augmentation de la population du castor est due à:

- La récolte de bois qui augmente le nombre de feuillus, ce qui améliore l'habitat du castor;
- La valeur de la fourrure est à la baisse: l'effort de piégeage est moindre.

Ainsi, il y a une hausse de l'abondance du castor près des axes routiers.

### Saviez-Vous que...

Apprendre à cohabiter avec le castor est un investissement à long terme qui demande une bonne connaissance de son territoire!



### CASTOR: Avez-vous pensé à la prévention?

De nombreuses actions préventives peuvent être réalisées afin de limiter les impacts du castor sur le territoire. En voici quelques exemples:

### Protéger les feuillus à l'aide d'un grillage




### L'aménagement de bande de protection boisée à dominance de résineux



### Aménagement près des ponceaux



### En aval



Ce type d'aménagement demande un entretien constant. mais est efficace et demeure une bonne solution à long terme!

\*images tirées du *"Guide d'aménagement et de gestion du territoire utilisé par le castor au Québec"* de la Fondation de la Faune du Québec

### L'aménagement de ponceaux de grandes circonférences ou la construction de ponts au lieu de ponceaux



### D'autres mesures préventives possibles:

- Hausser le niveau de la route par rapport à celui de
- Favoriser l'emplacement des ponts /ponceaux où il y a un dénivelé dans l'écoulement de l'eau et en absence de feuillus;
- Instaurer un système de surveillance;
- Minimiser le nombre de traverses de cours d'eau sur le réseau routier;

### Lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à réduire la pression du castor, le piégeage reste la méthode de gestion la plus efficace.

Favoriser la trappe pour limiter la déprédation à proximité des réseaux routiers: corridor de 300 à 500 mètres de part et d'autre du réseau

### Promouvoir le piégeage! Engager un trappeur!

- Distribuer des outils de travail aux piégeurs pour faciliter leurs interventions:
- Déterminer un montant forfaitaire uniforme à attribuer à un piégeur.




crédit photo: Antoine Martineau

### La fragmentation et la perte de l'habitat faunique

La fragmentation de l'habitat est la principale cause de perte de biodiversité. Le morcellement de la forêt, des corridors riverains et des milieux humides est une réalité dans la vallée. Les zones habitées et urbaines, la voirie, les activités agricoles, forestières et industrielles représentent des contraintes à la connectivité entre les milieux aquatiques et terrestres.

La faune doit franchir ces obstacles afin de combler ses besoins vitaux: l'alimentation, la reproduction et la protection (abris). Cependant, des corridors écologiques peuvent être restaurés et la connectivité améliorée.


Le défi que l'on vous propose est d'aménager le territoire en vue d'une gestion globale des habitats fauniques des périmètres urbains pour renforcer les réseaux écologiques mobilité permettant la espèces fauniques, notamment par la création de corridors riverains et fauniques.



Restaurer la connectivité des habitats: un outil de taille pour minimiser les impacts des changements climatiques!

Les changements climatiques ne sont pas qu'une légende scientifique. Déjà, les effets sont visibles dans la Matapédia. Par exemple, en regardant des données s'échelonnant sur 25 ans, on s'aperçoit que les débâcles printanières se produisent de plus en plus tôt dans l'année. Nous devons être prévoyants dans la gestion de notre milieu, car les changements iront en s'amplifiant!

Un habitat naturel bien relié saura maintenir son intégrité face aux changements climatiques, car les espèces présentes sont capables de vivre en symbiose pour leur survie et si besoin, d'évoluer ensemble.



Un habitat fragmenté aura plus de difficultés à s'adapter. Certaines espèces dont la taille de l'habitat n'est pas suffisante disparaîtront, remplacées par des espèces communes, voire parfois envahissantes. L'omble de fontaine pourrait être remplacé par la barbotte qui préfère des ruisseaux plus chauds avec des sédiments fins.

Effets visibles des changements climatiques

Augmentation de la température d'eau des ruisseaux

Étiage et sécheresses plus sévères


Crues plus sévères

**Exemple de corridor:** L'OBVMR constate que, durant l'été, la température d'un ruisseau dont les berges sont démunies de végétation peut augmenter de 2 à 6°C entre l'amont et l'aval. Ces tributaires ont donc perdu leur rôle réfrigérant pour le lac et les poissons.

Ainsi, une bande riveraine composée d'arbustes et d'arbres va procurer un ombrage au ruisseau, conservant son eau fraîche. Il s'adaptera mieux aux changements climatiques.

### Communauté autochtone de Listuguj

Le bassin versant de la rivière Ristigouche est couvert par le septième district du territoire Mi'gmag du Mi'gma'gi, comprenant huit communautés Mi'gmaq reconnues. En Gaspésie, ce sont trois communautés qui cohabitent: *Listuguj* à l'embouchure de la rivière Restigouche, *Gesgapegiag* à l'embouchure de la rivière Cascapédia et *Gespeg* à proximité de Gaspé. Au bord de la Ristigouche, côté Nouveau-Brunswick, est établie la communauté de Eel River Bar, *Ugpi'ganjig*. En 2000, les 3 communautés gaspésiennes ont fondé le Secrétariat Mi'gma'wei. Celui-ci a déposé une revendication territoriale globale aux gouvernements québécois et canadien. Une entente cadrée a ensuite été signée en 2012; depuis, les négociations sont en cours en vue de conclusions d'accords portants sur la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement et l'autonomie gouvernementale.



Les premiers explorateurs, qui furent guidés par les peuples autochtones, ont bénéficié eux aussi de ce vaste réseau leur permettant de traverser la péninsule et d'étudier les hauts plateaux de l'arrière-pays gaspésien. Les Mi'gmaqs commercaient avec les Européens et leur ont appris à vivre dans la région, partageant leurs connaissances sur les plantes et les fruits qu'ils pouvaient utiliser sans danger. Les Mi'gmaqs trappaient, chassaient, cueillaient et pêchaient le long de la Baie des Chaleurs. Ils étaient dépendants des ressources naturelles, dont le saumon.

Encore aujourd'hui, leur mode de vie et leur économie traditionnelle dépendent directement de l'eau, qui leur fournit transport, nourriture (en particulier le saumon), moyen de subsistance et valeurs culturelles et spirituelles.

En ce sens, les changements climatiques, l'utilisation non responsable de l'eau et sa dégradation affectent aussi les traditions et la culture autochtone. Le respect de l'eau et de toutes les formes de vie s'avère un dogme central des coutumes sociales, des valeurs, des croyances spirituelles et des pratiques de subsistance des Mi'gmaqs.


« Le bassin versant de la rivière Ristigouche est un réseau hydrographique qui maintient une pêche des plus productives au Canada pour le saumon et la truite. Pour les premières nations, cette pêche est autant traditionnelle, communautaire que cérémoniale » (MPO, 2005)





# Plan Directeur de l'Eau





# Votre municipalité et l'eau

### Municipalité de Saint-Noël

Informations générales

Superficie totale: **45,26 km²**Superficie terrestre: **44,48 km²**Superficie de <u>l'aire urbaine</u>: **0.92 km²** 

Superficie des milieux humides: **7.01 km²** % du territoire en milieux humides: **15.49%** 

Population: 392

Date de construction: 1906

### Bassins versants principaux:

BV Nord-Est BSL

- Blanche
- Tartigou

**BV** Ristigouche

BV Ristigouche


BV Matapédia

Sayabec Noire


### Petits lacs de tête:

- Lac Michaud
- Lac Boniface
- Lac Malfait

- Lac de la Montagne
- Lac Chic-Chocs



### À la limite entre le fleuve et la Baie-des-Chaleurs



### Utilisation de l'eau: eau potable

### Aires de captage des puits municipaux

Les aires de captage de l'eau potable sont des zones essentielles à protéger si l'on veut assurer la pérennité d'une alimentation en eau potable de bonne qualité.

Source d'approvisionnement Souterrain Nb de logements. desservis 367

**Catégorie RPEP** Catégorie 2

**Étude d'aire de captage**Non

Plan de protection de l'aire

Oui

**Protection du périmètre** Immédiat = 30 mètres Bactériologique = 100 mètres Virologique = 200 mètres

Avis d'ébullition Aucun
Pénurie d'eau Aucune

**Type de dépôts**Pente et altération, épaisseur 0.25 à 1m **Perméabilité**: Peu perméable

Sous-bassin versant BSL sans nom (bassin niveau 2)

**Indice Drastic** (*Vulnérable* ≥ 100; ≧ à 180 vulnérabilité élevée)

<u>Indice pour la municipalité</u>: 100 à 140 (Vulnérabilité moyenne)

Indice au puits: Manque de données
Statut: Manque de données

**Menaces**: Puits à proximité d'habitations (fosses septiques)

### Type de traitement de l'eau

Type de traitement Chloration, filtration,

enlèvement fer et manganèse

Dureté de l'eau

Norme canadienne\* 180 mg/litre
Votre concentration CaCO3\*\* Manque de données

\* Selon les <u>recommandations canadiennes</u>

### Estimation du coût de traitement\*

**Variables** 

Nb de personnes desservies: 343

<u>Consommation individuelle</u>: 222 l./pers./jour <u>Coût d'un traitement:</u> 1,50\$ pour 1m<sup>3</sup>

Coût pour un habitant 0,33\$/jour

Coût du traitement journalier 114.22\$/jour

Coût annuel du traitement 41 690\$

\*\*Selon les données du MAMH - Bilan 2022

### Saviez-Vous que...

Le traitement coûte 1,50\$/m³ d'eau en moyenne. En réduisant la consommation d'eau des citoyens, on réduit les coûts reliés au traitement supplémentaire de l'eau potable qui serait gaspillée.


### Pénurie d'eau puits privés

De nombreux puits de surface dans la municipalité (voir page suivante) sont aux prises avec des pénuries d'eau en période d'étiage.



### Votre consommation d'eau potable (2022)

On remarque une tendance d'augmentation de votre consommation d'eau potable.



<sup>\*\*</sup>Selon les données que vous nous avez fournies

### Utilisation de l'eau: eau potable (puits et réseaux privés)

### Puits privés (Aucun système d'aqueduc)

Nb de puits individuels 42 Approv. en eau souterraine\*

Approv. en eau de surface Manque de données

Nb puits ind. contaminés Manque de données

Dureté de l'eau

Norme canadienne\*\* 180 mg/litre

Concentration de CaCO3\*\*\* Manque de données

Type de traitement

Élimination du calcaire Manque de données (adoucisseur, appareil antitartre)

Filtration

Manque de données (sable/charbon actif, filtre à cartouche

carafe/poche filtrante, osmose)

Traitement purificateur/désinfectant *Manque de données* (chloration, stérilisateur UV, ultrafiltration)

- \* Selon les données documentées du SIH
- \*\* Selon les recommandations canadiennes
- \*\*\* Selon les données que vous nous avez fournies

### Aires de captage des puits privés

### Dépôts de surface

Dépôt de pente et d'altération, proglaciaire (0.25cm à 1m) Perméabilité:

**Indice Drastic** (≥ 100 = vulnérable; ≥ 180 = très vulnérable)

Indice moyen sur le territoire: 100-160

Statut Vulnérabilité moyenne

### Menaces

Puits à proximité d'habitations et de terres agricoles Aucune donnée sur les puits privés de surface Aucune caractérisation des installations septiques existantes

### Réseaux privés

Nb de réseaux privés (>20 pers.) 1 réseau lac Michaud

Contamination aux coliformes Non applicable

| Nom du réseau | Туре      | Nb pers.<br>desservies | Traitement | Contamination |
|---------------|-----------|------------------------|------------|---------------|
| Lac Michaud   | Manque de | Manque de              | Manque de  | Manque de     |
|               | données   | données                | données    | données       |

### Saviez-Vous que...

Votre eau peut être claire, inodore et agréable à boire, mais contenir des bactéries et des produits chimiques pouvant affecter votre santé.

Les dispositifs de traitement souvent installés pour améliorer l'apparence de l'eau (ex: adoucisseur, filtre au charbon actif, filtre au sable vert) n'éliminent pas les principaux risques à la santé.

### Aires de protection (catégorie 3)

Le <u>RPEP</u> définit trois périmètres de protection pour les puits de catégorie 3 où certaines activités sont proscrites.

1. Protection **immédiate**: 3 mètres du puits

2. Protection **bactériologique**: 30 mètres du puits

3. Protection virologique: 100 mètres du puits

Vérifiez qu'il n'y ait pas d'activités non souhaitées dans les périmètres de protection des puits privés tel que l'indique le RPEP.

### Analysez l'eau de votre puits au printemps et à l'automne

Le ministère recommande aux particuliers de faire réaliser l'analyse de l'eau de leur puits souterrain par un laboratoire accrédité au moins 2 fois par année pour la bactériologie (printemps et automne lors de la période d'étiage), ainsi qu'une fois par année pour les paramètres physico-chimiques (nitrite, nitrate, fer, manganèse).

### Méthode de prélèvement recommandée:

- Laisser couler l'eau pendant environ 5 minutes avant de procéder au prélèvement. 1.
- Enlever tout objet se trouvant sous le bec du robinet comme les aérateurs, les grillages, les pommes d'arrosage ou les tuyaux. S'il est impossible de les enlever, il est préférable de choisir un autre robinet. De plus, on recommande de nettoyer l'extérieur et l'intérieur du bec à l'aide d'une pièce de coton propre imbibée d'une solution commerciale d'eau de javel (environ 5 % d'hypochlorite de sodium).
- 3. Utiliser le robinet d'eau froide en s'assurant que le robinet d'eau chaude est bien fermé.

### Laboratoire accrédité

Laboratoire H2L 56, Montée **Industrielle-et-Commerciale** Rimouski (Québec), G5M 1B1 Téléphone: 418 723-8660

### Utilisation de l'eau: eau souterraine

# Vulnérabilité de l'eau potable

# Légende

### Puits

Puit municipal

Protection RPEP Puit privé

# Immédiate

Bactériologique Virologique Perméabilité

# Très perméable Perméable

# ■ Variable

# Municipal

Périmètre urbain Bâtiment

# \_\_\_ Limite municipale

Hydrographie Plan d'eau Cours d'eau

Date: 2022-12-12 Échelle: 1/40000 SCG: NAD83 / Quebec Lambert

Sources: BDAT, BDTQ, Gouv. QC, OBVMR, MRC La Matapédia, Google. Auteur: Mathieu Simard

Saint-Noël Infrastructures routieres Routes secondaires Menaces potentielles Routes principales Sites contaminés Gravière/carrière Site d'élimination 500 m Banc d'emprunt Depôt à neige à l'eau potable HH Voie ferrée Cimetière Industrie 0

### Utilisation de l'eau: eaux souterraines

### La contamination de l'eau souterraine et des puits privés

Plusieurs situations peuvent faire en sorte de contaminer l'eau d'un puits:


Mauvaise localisation du puits par rapport au système de traitement des eaux usées Exemple: le puits se situe en aval de de la fosse septique ou du puisard


Système de traitement des eaux usées trop près du puits. *Exemple: normes du ministère non respectées* Mauvaise étanchéité du puits ou du système de traitement des eaux usées (ex. puisards) *Exemple: le système de traitement est un puisard* 

Le système de traitement des eaux usées est situé à un endroit où la nappe phréatique est peu profonde

Une mauvaise localisation ou une mauvaise étanchéité d'un puits ou d'un système de traitement peut facilement faire en sorte de

contaminé l'eau souterraine et conséquemment le puits.







Groupe Roch Bernier,

En automne et au printemps, il y a un plus grand risque de

contamination, car la nappe

phréatique est plus élevée.

### Quatre pistes d'action pour améliorer la qualité de l'eau des citoyens:

Votre municipalité peut jouer un rôle important pour réduire les obstacles à la surveillance de la qualité de l'eau potable provenant des puits. Quatre mesures très simples sont proposées pour encourager les citoyens à faire le suivi de leur eau potable:

### Informer les nouveaux propriétaires de puits

Sensibiliser les nouveaux propriétaires de puits en leur distribuant la fiche d'information «**Propriétaire de puits?**»\* lors de l'envoi des droits de mutation immobilière ou des demandes de permis.

### Site Web et bulletin municipal

Sensibiliser les propriétaires de puits en publiant la fiche d'information «Propriétaire de puits?»\* sur le site web de la municipalité et dans le bulletin municipal 2 fois par année pour un rappel périodique (printemps et automne).

### 3 Envoi ciblé

Communiquer directement avec les propriétaires de puits pour établir la liste des propriétaires de la municipalité et envoyer la fiche d'information «Propriétaire de puits?»\* seule ou la joindre au compte de taxes des citoyens concernés.

### Organiser la distribution de trousses d'échantillonnage

- Distribuer des trousses d'échantillonnage lors d'une journée spéciale ou en tout temps, selon votre choix;
- Vous pouvez entrer en contact avec un laboratoire accrédité pour négocier une entente de service;
- Faites connaître le service aux citoyens par votre site Web. **Opération puits: intérêt**

\*Fiche disponible sur le site web Aspects Lég'eaux (http://robvqc.wixsite.com/legal#!eau-potable/c18ru)



Le site web Aspects
Lég'eaux est un excellent
outil d'accès au savoir
juridique dans le domaine
de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Celui-ci
regroupe plusieurs fiches
synthèse, outils et liens qui
permettent de comprendre
facilement les
réglementations qui
touchent le domaine de
l'eau.

### Sujets traités

Partage de compétences
Sources d'eau potable
Eaux usées
Bandes riveraines
Hydrocarbures
Activités nautiques & accès
à l'eau
Eaux pluviales

Milieux humides
Accéder au site:

https://robvqc.wixsite.com/le

<u>gal</u>

### Utilisation de l'eau: eaux usées traitement municipal

### Réseau d'égouts et pluvial

**Type de réseau** Pseudo-séparé

Nb de pers. desservies 350
Nb ouvrages de surverses 1

Aucune donnée dans le système SOMAE.

### Type de traitement des eaux usées

**Type de traitement** *Étangs aérés à parois* 

verticales

Mise en place 1998\*

Conformité avec le MELCCFP Oui / Non

**Objectif réduction phosphore\*\*** Oui / Non

Gestion des boues municipales Données à compléter

\*Selon le MAMH, les systèmes de plus de 10 ans risquent de devoir être mis à niveau dans le futur si ce n'est pas déjà fait, voir remplacés.

\*\*Position ministérielle pour la réduction du phosphore dans les rejets d'eaux usées d'origine domestique, qui considère l'installation d' équipement de déphosphatation pour certaines municipalités.

### Localisation des émissaires

Manque de données

### Saviez-Vous que...

Les eaux pluviales apportent quatre fois plus de matières en suspension que les eaux usées traitées!

### Type de réseau à St-Noël

Un réseau d'égout séparé se compose de deux canalisations transportant séparément les eaux pluviales et les eaux usées domestiques, tandis qu'un réseau unitaire combine ces deux utilités en une seule canalisation. Un réseau pseudo-séparé signifie que certains tronçons sont unitaires tandis que d'autres sont séparés. Les segments unitaires peuvent être considérés problématiques puisqu'ils entraînent le rejet d'eaux usées dans l'environnement lors de fortes pluies. La qualité des eaux de surface se voit grandement affectée à l'exutoire de ce dispositif.

### La problématique des eaux pluviales

Bien que les eaux usées pluviales soient généralement plus propres que les eaux usées domestiques, elles peuvent être chargées de sédiments et polluées par des contaminants (pesticides, hydrocarbures, résidus industriels, dépôts clandestins, sels de déglaçage, etc.). Il est fort probable que certains égouts pluviaux de la municipalité amènent les eaux de pluie directement au cours d'eau sans passer préalablement par une mesure d'atténuation des sédiments. Les effets sont surtout observables après la fonte des neiges ou les épisodes de pluies abondantes.

### Aperçu des fosses septiques dans la MRC

Étant donné le manque de données, quelques chiffres concernant les installations septiques ont été recueillis dans la MRC de La Matapédia en 2008 et peuvent être utilisés comme outil de référence pour votre municipalité.

Installations septiques conformes\* 20% (pour toute la MRC)
Nuisance directe environ 1%

Nuisance indirecte entre 34% et 36%

### La réalisation de relevés sanitaires

Le <u>Guide de réalisation d'un relevé sanitaire des dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées situées en bordure des lacs et des cours d'eau du MELCCFP est un excellent outil pouvant être utilisé à des fins d'évaluation de la performance des fosses septiques dans la municipalité. Ce court document inclut des fiches et des modèles d'inventaires et de classification permettant d'obtenir des informations en ce qui concerne les installations sanitaires des résidences isolées.</u>

\*Conforme à la réglementation Q-2,r.22 sur le traitement des eaux usées pour les résidences isolées

\*\*Données comparatives compilées ayant été effectuées pour d'autres municipalités du bassin versant

### Utilisation de l'eau: eaux usées traitement individuel

### Toute installation sanitaire individuelle

### Dans la municipalité

Nb total d'installations septiques: 45 à 50

Nuisance directe Manque de données

Nuisance indirecte Manque de données

### Autour du lac Michaud

(Caractérisation avec 37 relevés au total)

Nuisance directe 5 (classe C)
Nuisance indirecte 13 (classe B)

Source: Relevé sanitaire du Lac Michaud (2023)

### Pourquoi est-ce important d'avoir une installation septique aux normes?

Les eaux usées non traitées ou mal traitées présentent un risque imminent pour la santé humaine et l'environnement. Une installation présentant des nuisances directes ou indirectes, soit sans traitement, soit fuyantes, risque de contaminer les puits et les plans d'eau à proximité en nitrites, en nitrates, en coliformes fécaux, en coliformes totaux et en entérocoques. Ces contaminations rendraient l'eau impropre à la consommation, voir aux activités récréotouristiques.

### La réalisation de relevés sanitaires

Le <u>Guide de réalisation d'un relevé sanitaire des dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées situées en bordure des lacs et des cours d'eau du MELCCFP est un excellent outil pouvant être utilisé à des fins d'évaluation de la performance des fosses septiques dans la municipalité.</u>

### Plan d'actions: réduire les impacts des installations septiques

1-Mettre aux normes les installations individuelles déficientes selon un ordre de priorités:

| Classe | Définition                               | Mesure corrective   |  |  |  |
|--------|--|---|--|--|--|
| AA     | Performante et conforme                  | Aucune mesure corrective requise, des correctifs mineurs peuvent être proposés                          |  |  |  |
| А      | Performante et<br>non conforme           |   |  |  |  |
| BBB    | Nuisance<br>indirecte non<br>prioritaire | Installation ne possède<br>pas les caractéristiques<br>requises pour permettre<br>un traitement adéquat | Ne constitue pas une source de contamination des eaux superficielles<br>importantes, mais la durée de sa performante sera écourtée. Ce type de<br>système devrait être changé à moyen terme. |  |  |
| BB     | Nuisance<br>indirecte à<br>surveiller    | Le règlement Q-2, r.22<br>n'exige pas le<br>remplacement de ce<br>système                               | Devrait devenir une source de contamination indirecte importante à<br>moyen terme. Ce type de système doit faire l'objet d'inspections régulières<br>et devrait être changé à moyen terme.   |  |  |
| В      | Nuisance<br>indirecte<br>prioritaire     |   | L'apport de phosphore au lac devrait être important<br>Système appelé à devenir une nuisance directe (classe C) prochainement.<br>Ce type de système doit être changé à court terme.         |  |  |
| С      | Nuisance directe                         | Correction et remplacement obligatoire en vertu du règlement Q-2, r.22                                  |  |  |  |

- **2-** Préconiser des installations communes (municipales ou privées) dans les secteurs trop densément occupés;
- **3-** Implanter un programme de vidange des installations sanitaires et adoption d'un règlement en ce sens.

### Saviez-Vous que...

Contrôler sa consommation en eau et éviter les produits chimiques prolongent la vie de votre installation septique, qui est en moyenne de 20 à 30 ans!

### Moyens et outils de gestion

- -Programmes de la Société d'Habitation du Québec tels que le programme RénoRégion et le Programme de réparations d'urgence;
- -Institutions financières exigent la conformité d'une installation lors d'une transaction; certains agents d'immeubles sont également sensibilisés à cet élément qui devient facilement un vice caché;
- -Crédits d'impôts disponibles pour la rénovation et l'amélioration des résidences;
- -Volonté politique de ne pas attendre la plainte pour corriger une installation grossièrement polluante;
- -Pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) de régir le lieu et l'implantation des bâtiments;
- -Pouvoir en vertu de la LAU d'établir des règlements sur le maintien de l'intégrité des bandes riveraines (maintien des 3 strates: herbacée, arbustive et arborescente). Pour plus d'informations voir le site <a href="http://robvqc.wixsite.com/legal/eaux-usees">http://robvqc.wixsite.com/legal/eaux-usees</a>

### Utilisation de l'eau: eaux usées

### Et vous, respectez-vous la norme?

La norme indique que les systèmes de traitement étanches ou non étanches, ou tout élément d'un de ces systèmes, doivent être installés à un endroit:

- qui est exempt de circulation motorisée;
- où il n'est pas susceptible d'être submergé;
- qui est accessible pour en effectuer la vidange;
- qui est conforme aux distances indiquées dans le schéma ci-dessous

### Fréquence des vidanges


Système de traitement primaire\*:

- Vidange aux 2 ans pour les résidences utilisées à l'année
- Aux 4 ans pour les résidences saisonnières

\*Exception: Dans le cas où c'est la municipalité qui voit à la vidange des fosses septiques, la fosse septique doit être inspectée une fois par année et vidangée:

- Par période fixe ci-dessus

- Selon la mesure des boues et écumes: si les boues atteignent 30 cm; si l'épaisseur des écumes atteint 12 cm. (article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales).



MELCCFP (2015). Traitement des eaux usées des résidences isolées, Guide technique, 224 p.

### Développement en zone habitée: rives et sédimentation

### Cours d'eau linéarisés, deltas et traces d'érosion


| Cours d'eau                               | Linéarisé | Delta | Traces<br>d'érosion | Particules<br>fines |  |
|---|-----------|-------|---------------------|---------------------|--|
| Tête de Tartigou dans<br>périmètre urbain | oui       | nd    | nd                  | oui                 |  |
| Cours d'eau St-Pierre                     | oui       | nd    | nd                  | oui                 |  |
| Br. 2 Paradis                             | oui       | nd    | nd                  | oui                 |  |

\*Les cas présentés ci-dessus sont seulement ceux connus. Il est fort probable qu'il existe plusieurs autres cas de linéarisation, de delta ou d'érosion qui n'ont pas encore été identifiés.

### Une bande riveraine en zone habitée est de 10m minimum\*

Une bande riveraine efficace est composée au minimum de 2 strates de végétation (herbacée, arbuste/arbre) et doit respecter une largeur **à partir du début de la rive** en fonction de sa pente et de la présence d'un muret:

Pente <30%, sans muret ni talus: 10 mètres minimum Pente <30%, muret/talus > 5m: 15 mètres minimum Pente >30% avec ou sans muret: 15 mètres minimum



\*Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

### Les cours d'eau dans vos zones habitées

Zones à surveiller dans le secteur habité de Saint-Noël

| Zone         | Spécifications | IQBR  |
|--------------|----------------|-------|
|              | Érosion et     | ND    |
| piétonnières | ruissellement  | . , _ |

### Les ouvrages de stabilisation ont une durée de vie limitée (30 à 50 ans)

Un cours d'eau linéarisé va à long terme se surcreuser à la base provoquant la dégradation du mur de soutènement (1a à 3a). Végétaliser et, si possible, adoucir la pente permet une stabilité plus durable (1b à 3b).

Évolution de la bande riveraine d'une rive linéarisée



Avec végétation dense


2b

Ouvrage de retenue affaiblit, mais les racines retiennent le sol

Racines prolifèrent et augmentent la stabilité du sol

| Zones industrielles et leurs caractéristiques |                             | Niveau de problématique  Problématique  Moyennement problématique  Peu problématique |   |    | oblématique  |   |        |
|---|-----------------------------|--|---|----|--|---|--------|
|   | Caractéristiques de la zone |  | de la zone  |    |  | Priorité  |        |
| Zone industrielle                             | Imperméabilisation          | Ruissellement  | Distance d'un plan d'eau IQBR à (en mètres) proximité |    | Remarques  | intervention                                    |        |
| Meunerie Bernard<br>Landry                    | Gravier<br>compact          | Accumulation<br>d'eau sur place Rivière Tartigou: 10m                                |   | ND | Bonne bande<br>riveraine en marge,<br>attention aux rebuts | Faible  |        |
| Garage municipal                              | Gravier<br>compact          | Aucun  |   | ND | ND   | Canalisation d'un<br>ruisseau sous le<br>garage | Faible |

### Développement en zone habitée: dynamique de l'eau et drainage



<mark>Certaines zones où le drainage de l'e</mark>au est très peu efficace (imparfait, mauvais ou très mauvais) sont considérées comme des aires potentielles de développement de milieux humides. La carte ci-dessus délimite ces zones. Elle est donc un élément clé dans la conservation et la protection de ces milieux précieux où le développement en zone habitée devrait être limité.

### Développement en zone habitée: nouvelles constructions et voirie

### Voiries et traverses

Certaines zones problématiques ont été observées mais ne sont pas analysées pour le moment. Un plan de gestion des eaux de ruissellement doit être fait afin de définir les zones prioritaires.

Défi lancé à la municipalité: lancer une campagne de caractérisation du ruissellement dû à la voirie pour identifier les zones les plus problématiques, et agir.

### Impacts de la voirie reliés à l'érosion

### Impacts économiques

Perte de sols fertiles Blocage des égouts et ponceaux Augmentation du coût de production d'eau potable Augmentation du risque d'inondation Dégradation paysagère

### Impacts écologiques

Destruction des habitats piscicoles Asphyxie des poissons Réchauffement de l'eau Réduction de la transparence Apport de polluants avec les sédiments

### Zones humides et drainage

Certaines zones dont le drainage de l'eau est mauvais sont considérées comme des aires potentielles de développement de milieux humides. Le manque de données ne nous permet pas de développer plus à ce sujet.

Le développement de zones habitées doit être réduit dans les zones considérées comme humides. Une caractérisation des milieux humides est donc nécessaire.

### Atténuation de sédiments pour les sites en construction

Les sites en construction peuvent être la source d'une importante quantité de sédiments pouvant être recueillis par l'eau lors de son passage.

### Avez-vous des règlements pour contrôler l'érosion en chantier?

L'application d'un Règlement sur les permis relatifs au contrôle de l'érosion lors du remaniement des sols sur les sites de construction\* peut être un moyen efficace pour contrer l'érosion et la sédimentation lors de travaux.

### Avez-vous un plan de gestion des sols?

La section 1 du <u>Guide des bonnes pratiques dans la lutte à l'érosion et à l'imperméabilisation des sols</u> rédigé par le groupe APEL\*\* est également un très bon instrument de gestion pour diminuer l'impact des chantiers sur nos cours d'eau. Dans ce quide, cinq problématiques liées au chantier sont décrites:

- 1. Les sols mis à nu
- L'entreposage du matériel d'excavation mal localisé et évacuation tardive des déblais
- 3. L'accès au chantier non stabilisé
- 4. La mauvaise protection des systèmes de drainage
- 5. La mauvaise préparation pour l'hiver

La section propose plusieurs solutions et exemples de mesures réglementaires pour remédier à ces problématiques.

https://rappel.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/RAPPEL\_Reglementtype-controle-de-lerosion.pdf (page consultée le 11 mars 2025).

### Saviez-Vous que...

Un hectare en zone habitée équivaut à 5 hectares agricoles en termes d'apports en sédiments dans les cours d'eau!

|   | Zone d'impact  |
|---|--|
| Routes à 2 voies  | < 35 mètres d'une végétation sensible<br>< 30 mètres de tout ouvrage de<br>captation   |
| Centre d'entreposage<br>et de manutention<br>des sels de voirie | < 60 mètres d'un milieu humide<br>< 100 mètres de tout ouvrage de captage<br>< 50 mètres de la limite des inondations de récurrence<br>de 2 ans ou de la ligne des hautes eaux |
|   | Centre d'entreposage<br>et de manutention  |

<sup>\*</sup>Exemple édifié par le regroupement d'experts sur la gestion de l'eau RAPPEL et disponible en ligne:

<sup>\*\*</sup>Association pour la protection de l'environnement du lac St-Charles et des Marais du Nord

### Gestion des eaux de ruissellement: paramètres et gestion

### Les paramètres liés au ruissellement

Chaque aire de ruissellement est unique en raison des nombreux paramètres susceptibles de modifier les conditions d'écoulement de l'eau. Parmi ces facteurs, on inclut le type d'utilisation du sol, la superficie de l'aire de drainage, le coefficient d'écoulement, la pente, le temps de concentration (durée), ainsi que l'intensité de pluie.

Le type d'utilisation du sol et coefficient de ruissellement: Chaque type d'utilisation du sol (agricole, résidentiel forestier, pelouse, industriel, pavement) a un patron d'espace et de matière/matériaux définis qui vont influencer le ruissellement.

Le type de surface: La rugosité et la perméabilité d'une surface influencent grandement l'apport en eau de ruissellement dans une aire. Une surface lisse et imperméable évacuera un grand volume d'eau rapidement.

La superficie de l'aire de drainage: La dimension de l'aire de drainage influence la quantité d'eau captée par celle-ci. En ce sens, plus l'aire est grande, plus il y aura une grande quantité d'eau disponible pour ruisseler par la suite.

La pente: Une pente plus forte, pour toute surface, évacue l'eau plus rapidement par l'effet de la gravité.

Le temps de concentration et l'intensité de pluie: Une pluie qui dure longtemps et est plus intense sature les sols d'eau, ce qui fait en sorte que l'eau s'accumule et s'évacue sur la surface, accentuant le ruissellement.

### Saviez-Vous que...

Lorsqu'il pleut, une grande quantité d'eau est interceptée et stockée par les arbres sur leurs feuilles et leurs branches, ce qui réduit la quantité d'eau de ruissellement, puisque l'eau est lentement redistribuée ou simplement évaporée au fil du temps.

Une étude ayant été réalisée à Santa Monica (Californie) a démontré que les arbres de la ville interceptaient près de 193 000 m³ d'eau par année, soit l'équivalent d'environ 52 piscines olympiques!

### Mesures de gestion du ruissellement

L'eau agit comme vecteur de transport primaire pour les sédiments. Pour réduire les apports, on cherche donc à favoriser l'infiltration en faisant appel à des techniques de contrôle à la source, dans le réseau et/ou en aval. Lorsque ces méthodes sont adéquatement utilisées, elles permettent d'améliorer la qualité de l'environnement, mais aussi d'éviter des pertes d'argent considérables à la longue.

Par exemple, en laissant percoler l'eau sur place, on limite l'érosion des cours d'eau et conséquemment l'entretien des berges, les dommages aux infrastructures (réseau pluvial, routes) deviennent moins fréquents et la filtration par le sol diminue les coûts du traitement par la municipalité.

### Voici quelques exemples de méthodes de gestion à prévaloir

| À la source                       |                                    | Dans le réseau    | En aval                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| Jardin de pluie                   | Bande filtrante                    | Noues             | Bassins de rétention<br>(secs et immergés) |
| Barils de récupération            | Revêtement<br>perméable            | Fossés            | Marais filtrants                           |
| Puits absorbants<br>Débranchement | Grille pluviale  Zone de rétention | Réseaux percolant | Bassins de rétention souterrains           |
| des gouttières                    |                                    |                   |  |


### Gestion des eaux de ruissellement: foresterie

### Dénivelé des rivières

Les cours d'eau ayant une dénivellation plus élevée auront plus tendance à éroder et transporter rapidement les sédiments vers l'aval. Il faut donc surveiller les routes forestières qui croisent les rivières ou les ruisseaux à fort dénivelé, car ce sont elles qui apporteront le plus de sédiments.

### Profils de dénivellation du bassin versant rivière Matapédia






### Mesures protection et mise en valeur en forêt privée

Voici quelques exemples d'actions réalisables pour protéger vos habitats aquatiques des impacts de la foresterie en secteur privé.


- Sensibiliser les propriétaires à mettre en oeuvre les mesures de protection proposées dans le Guide de saines pratiques d'intervention en forêt privée du MRNF
- ✓ Encourager les propriétaires à identifier les cours d'eau avec un potentiel de fraie et à reporter leurs observations
- ✓ Encadrer de manière plus restrictive la voirie forestière, notamment au niveau des traverses et des approches de cours d'eau\*

\*Le *Guide de saines pratiques de voirie forestière et installation de ponceaux* du MRNF est un outil particulièrement simple et efficace qui devrait être pris en compte.






### Des dénivelés et des panaches



### Gestion des eaux de ruissellement: aires de drainage


#### Qu'est-ce qu'une aire de drainage? C'est un plus petit bassin versant

«Une aire de drainage urbaine est une superficie en milieu urbain où l'eau est drainée et évacuée par l'entremise d'un exutoire, soit un drain pluvial ou un fossé».





(Source : Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, adapté à la réalité du bassin versant Matapédia-Restigouche par l'OBVMR)

«Une aire de drainage urbaine est un petit bassin versant à l'échelle d'une zone habitée.».



### Gestion des eaux de ruissellement: aires de drainage





### Gestion des eaux de ruissellement: aires de drainage

Voici un sommaire de chacune des aires de drainage de la carte précédente.

| # Aire de<br>drainage | Localisation      | Description et observations  |
|-----------------------|-------------------|--|
| 1                     | Rue St-Joseph O   | <ul> <li>Pente très forte à l'arrière des maisons</li> <li>Aucune canalisation</li> <li>Milieu récepteur est un tributaire de la Tartigou</li> </ul>   |
| 2                     | Rue St-François   | <ul> <li>Secteur Ouest résidentiel percolant, avec un apport important en sédiments</li> <li>Semble être indépendant de l'aire de drainage 4, tributaire en arrière de la caserne canalisé jusqu'à Tartigou</li> <li>Pluvial passe entre bâtisse municipale et rue Turcotte</li> <li>Exutoire dans la rivière Tartigou</li> </ul>  |
| 3                     | Route 297         | <ul> <li>Sous-bassin versant différent de AD#2 et du reste de St-Noël</li> <li>Semble aboutir dans milieu humide, tête de tributaire, arrive des champs en amont</li> <li>Grosses grilles du MTQ</li> <li>Milieu récepteur dans les champs</li> </ul>  |
| 4                     | Route St-Alphonse | <ul> <li>AD#4 ramasse route 297, l'église et rue Turcotte notamment, pour se jeter dans le drain pluvial au bout de la rue St-Alphonse (rejet d'hydrocarbure observé à cet endroit)</li> <li>Beau projet potentiel collectif de GDEP avec la grande aire asphaltée commune (voir lieux problématiques et solutions)</li> <li>Milieu récepteur est la rivière Tartigou</li> </ul> |
| 5                     | Route 297         | <ul> <li>Plusieurs coupes forestières récentes</li> <li>AD étangs d'épuration et hors périmètre urbain</li> <li>Plusieurs coteaux</li> <li>Puisards 2 côtés de la rue</li> <li>Fossés bien enherbés, meunerie</li> <li>Milieu récepteur est la rivière Tartigou</li> </ul>   |
| 6                     | Rue St-George     | <ul> <li>Pont piétons</li> <li>Drain pluvial brisé</li> <li>Milieu récepteur est la rivière Tartigou</li> </ul>  |
| 7                     | Route McNider Sud | <ul> <li>Garage municipal (voir recommandations)</li> <li>Coupe forestière</li> <li>Terrain à vendre accumulant l'eau</li> <li>Exutoire dans un tributaire de la Tartigou</li> </ul>   |
| 8                     | Route McNider Sud | <ul> <li>Coupe forestière</li> <li>Drainage vers le lac Michaud</li> </ul>   |
| 9                     | Route 297         | <ul> <li>Grand drainage de terrains agricoles vers la rivière Tartigou</li> <li>Milieu récepteur: ruisseau tributaire de la Tartigou très linéarisé</li> </ul>   |
| 10                    | Rue St-Joseph O   | <ul> <li>Drainage de terrains agricoles et résidentiels vers la rivière Tartigou</li> <li>Milieu récepteur: tributaire de la Tartigou</li> </ul>   |
| 11                    | Rue St-Joseph E   | Drainage de pente forte résidentielle et agricole vers l'AD#4 en longeant le chemin de fer   |

### Gestion des eaux de ruissellement: zones problématiques

#### Coupe forestière (48.580928, -67.837402)






Exemple de solutions correctives ponctuelles

Végétalisation des fossés et plantation d'arbres




Pente forte St-Georges (48.580808, -67.831833)





Végétalisation des berges (ou aménagement pluvial)



**Stationnement de l'église** (48.584236, -67.835744)






Aménagement pluvial sur la surface gazonnée captant les eaux du stationnement




### Gestion des eaux de ruissellement: zones problématiques





**Terrain privé en marge d'un ruisseau** (48.582569, -67.833049)



Pente du garage municipal (48.579257, -67.829485)







Biofiltration du toit du garage ou barils de pluie

Source: Ville de Bromont

Pente - de 30 %



### Gestion des eaux de ruissellement: aires problématiques

### Mesures de gestion du ruissellement

L'eau agit comme vecteur de transport primaire pour les sédiments. Pour réduire les apports, on cherche donc à favoriser l'infiltration en faisant appel à des techniques de contrôle à la source, dans le réseau et/ou en aval. Lorsque ces méthodes sont adéquatement utilisées, elles permettent d'améliorer la qualité de l'environnement, mais aussi d'éviter des pertes d'argent considérables sur le long terme.

Par exemple, en laissant percoler l'eau sur place, on limite l'érosion des cours d'eau et conséquemment l'entretien des berges. Les dommages aux infrastructures (réseaux pluviaux, routes) deviennent moins fréquents et la filtration par le sol diminue les coûts de traitement pour la municipalité.

| Lieu de<br>réduction | Mesure de gestion                        | Impacts                    |   |                          |                                     |  |
|----------------------|--|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--|
|                      |  | Réduction du ruissellement | Contrôle de la<br>qualité de l'eau<br>(pollution) | Contrôle de<br>l'érosion | Recharge de la<br>nappe souterraine |  |
| À la source          | Barils de récupération des eaux de pluie | <b>√</b>                   |   | ,                        |                                     |  |
|                      | Jardins de pluie                         |                            | $\checkmark$                                      | <b>✓</b>                 |                                     |  |
|                      | Puits absorbants                         | <b>✓</b>                   |   | <b>✓</b>                 | <b>✓</b>                            |  |
|                      | Bandes filtrantes                        | $\checkmark$               | <b>√</b>  | <b>✓</b>                 | <b>✓</b>                            |  |
|                      | Zones de rétention                       | <b>√</b>                   |   | <b>√</b>                 | <b>√</b>                            |  |
|                      | Revêtements perméables                   | <b>√</b>                   |   |                          | <b>√</b>                            |  |
|                      | Débranchement des<br>gouttières          |                            |   |                          | <b>✓</b>                            |  |
| Dans le réseau       | Noues                                    | <b>1</b>                   | <b>1</b>  | <b>\</b>                 |                                     |  |
|                      | Fossés végétalisés                       | <b>√</b>                   | <b>√</b>  | <b>√</b>                 |                                     |  |
|                      | Réseaux percolants                       | $\checkmark$               |   |                          | $\checkmark$                        |  |
| En aval              | Bassins de rétention                     | <b>√</b>                   |   | <b>√</b>                 |                                     |  |
|                      | Marais filtrants                         | <b>✓</b>                   | <b>√</b>  | <b>√</b>                 | <b>✓</b>                            |  |
|                      | Bassins de rétention souterrains         | <b>√</b>                   |   | <b>√</b>                 |                                     |  |

### Comment lutter contre le ruissellement urbain? Par des jardins de pluie!

Pour concevoir et construire un jardin de pluie, utilisez le guide suivant:



Et sa feuille de calcul automatisée

Consultez les capsules vidéo explicatives:





Pour tous les détails, rendez-vous au <a href="https://www.obvmr.org/jardins-de-pluie">https://www.obvmr.org/jardins-de-pluie</a>

### Biodiversité: vos richesses

# Cohabitation Anguille Bécasse Butor d'Amérique Grand Pic Héron Omble de fontaine Saumon atlantique Sauvagine

Il s'agit de seulement quelques exemples d'espèces que l'on peut retrouver sur votre territoire.





Différences entre le tacon de saumon, l'omble de fontaine et le saumoneau. © MFFP.

#### Milieux humides potentiels

Ce sont des milieux méconnus dans le bassin. Une caractérisation est nécessaire pour mieux protéger ces milieux sensibles.

Types de milieux humides susceptibles d'être retrouvés:

- Étang
- Marais
- Prairie humide
- Marécage arbustif
- Marécage arborescent
- Tourbière boisée
- Herbier aquatique

Ne laissons pas les milieux humides disparaître avant de les connaître

#### **OMBLE FONTAINE:**

- Entre septembre et octobre, le frai s'effectue sur un substrat de gravier en eau peu profonde. Les conditions doivent être les suivantes:
  - Vitesse du courant: 40 à 90 cm/seconde
  - Température de l'eau: 3 à 13 degrés Celsius
  - Oxygène dissous: 9 à 11 mg/L
  - Profondeur: 10 à 30 cm
  - Substrat: 0,9 à 4 cm de diamètre
- Après avoir nettoyé le substrat avec ses nageoires, la femelle dépose ses œufs; une fois fécondés, elle les recouvre de gravier.
- Les œufs mesurent de 3,5 à 5 mm de diamètre.
- Éclosion après une période de 50 à 100 jours.



### Biodiversité: potentiels d'habitats aquatiques

### Milieu humides et Biodiversité

### Légende

## Milieux humides

# Eau peu profonde

Marécage Marais

Tourbière boisée Prairie humide

Tourbière (bog) Tourbière (fen)

Autre milieu humide

Hydrographie Plan d'eau

Cours d'eau intermittent Cours d'eau

Bassin versant (niv. 1)

### Voies de communication — Route principale

Route secondaire

H+ Voie ferré


Municipal

Échelle: 1/100000 Date: 2025-10-30


SCG: WGS 84 / Pseudo-Mercator

Auteur: Mathieu Simard

Sources: BDAT, BDTQ, Gouv. QC, OBVMR, MRC La Matapédia, Google, Canards illimités.



### Biodiversité: bandes riveraine du lac Michaud 2024



Source: Caractérisation du lac Michaud

### OBVNEBSL: Plan d'action du lac Michaud

En mars 2025, un plan d'action a été mis en place avec les acteurs du milieu et l'OBVNEBSL concernant le lac Michaud. Voici les actions qui touchent la municipalité:

- 1.1.1. Distribution d'arbres, d'arbustes et d'herbacés.
- 1.1.2. Végétalisation des berges et dans les enrochements lorsque possible (ou de plantes rampantes recouvrant les ouvrages).
- 1.1.3. Développer une politique municipale plus complète et offrant des alternatives concernant la gestion des pelouses en milieu riverain et des bandes riveraines. Description: Présenter diverses options aux citoyens pour la végétalisation en fonction de la réalité des terrains. Sensibiliser les entreprises de tonte de pelouses.
- 1.1.4. Adoption d'une réglementation afin d'obliger la restauration des bandes riveraines.

Description: Améliorer la qualité du lac sur le long terme.

- 1.2.1. Caractérisation des installations septiques en place.
- 1.2.2. Mise en place d'un prêt à intérêt préférentiel incitatif pour la mise aux normes des installations septiques (règlement d'emprunt). Description: par l'entremise d'un règlement d'emprunt par exemple.
- 1.2.3. Mise en place d'un programme d'une vidange de fosses septique.

Description: Depuis 1991, en collaboration avec les municipalités participantes, la MRC de La Matanie gère le service de vidange des boues de fosses septiques des résidences isolées du territoire.

1.2.7. Réglementation / politique / sensibilisation sur l'utilisation de produits ménagers.

Description: la municipalité pourrait adopter une réglementation ou une politique pour restreindre l'usage de produits plus problématiques que d'autres en termes d'apport en phosphore et phosphate. Les produits biodégradables pourront être mis de l'avant comme bonne pratique.

- 1.3.1. Réaliser un portrait de l'impact du milieu agricole et forestier dans le bassin versant du lac Michaud. Description: Obtenir un portrait clair de la situation en milieu agricole.
- 1.3.1. Mise en place de pratiques agroenvironnementales dans le bassin versant.

Description:

- •Ouvrages hydro-agricoles (bassin de sédimentation, chute enrochée)
- Pratiques de conservation des sols (cultures de couverture / intercalaires, travail réduit du sol, épandages lors de temps secs, etc.).
- •Bandes riveraines élargies et la réalisation de brise-vent en milieu agricole.
- 1.3.2. Évaluer l'apport de nutriments dans le lac par les différents affluents agricoles et forestiers autour du lac.

Description: La première étape est d'évaluer si les milieux agricoles dans le bassin versant des lacs apportent des nutriments en quantité importante aux lacs, ceci peut s' évaluer à l'aide d'analyses d'eau. Ensuite, si des problématiques sont décelées, des projets d'aménagement pourront être réalisés.

1.4.2. Éducation sur la gestion durable des eaux de pluie résidentielles.

Description: Faire comprendre l'impact de la sédimentation sur les milieux aquatiques, confection de jardins de pluie, distribution/vente du guide traduit par l'OBVMR, etc.

1.4.3. Réglementation visant à interdire l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides résidentiels sur un rayon donné autour du lac.

Description:

- •Important de limiter les intrants au lac des pesticides et engrais pour assurer la qualité de l'eau.
- •La sensibilisation reste la première étape à réaliser auprès des riverains.
- •MRC: bande riveraine et engrais, des réglementations s'en viennent.
- 2.1. Réalisation d'analyses d'eau 3 fois par saison estivale sur les lacs et analyses de transparence de l'eau grâce au disque de Secchi pendant la saison estivale.

Description:

- Programme RSVL.
- •Programme sentinelle des lacs.
- 3.1.3. Outils de diffusion de matériel.

Description: Diversifier la sensibilisation des propriétaires riverains par de nombreuses méthodes:

- Envois postaux.
- 2. Partage de l'information sur toutes les plateformes des acteurs responsables.
- Journaux municipaux.
- l. Collants et/ou affiches à mettre à la maison et sur le terrain (collants sur les bateaux, collant «je tiens à mon lac» sur les maisons.
- 5. Aimants/aides-mémoire à coller sur le frigo.
- Affichage au débarcadère à bateaux.
- 3.1.6. Limiter l'intrant d'espèces exotiques envahissantes (EEE).

Description:

- •Le lavage du matériel nautique est la seule manière de limiter la propagation d'espèces aquatiques envahissantes.
- Municipalité non ciblée, mais reste intéressant.



### Biodiversité: charte des lacs à code éthique nautique

La charte des riverains existante depuis 2008 au lac du Portage et fut signé par la majorité des riverains. Ensuite, l'association du lac du Portage développa son code éthique nautique qui lui permettra d'être innovants dans la région et instauré au corridor de bouées.

Ces engagements volontaires permettent de conscientiser les riverains à la protection de leur lac par des actions simples et éco responsables, qu'ils soient résidents depuis longtemps ou nouveaux arrivants.

### Charte des riverains: aménagement des terrains riverains

- Aménager ses 5 mètres d'ouverture réglementaire au lac avec des végétaux et limiter le ruissellement de votre terrain directement dans le plan d'eau;
- O Laisser pousser la végétation dans la bande riveraine en bordure de mon plan d'eau sur une largeur de 10 à 15 mètres;
- O **Reboiser** les rives de son plan d'eau avec les trois strates végétales herbacée, arbustive et arbres afin de créer des filtres naturels;
- O **Cesser** toute fertilisation chimique ou naturelle (comme le compost) et abandonner l'usage de pesticides sur la rive sur une largeur d'au moins 15 mètres;
- O **S'assurer** du bon fonctionnement de son installation septique et vérifier si elle est conforme au <u>Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées</u>;
- O **Utiliser** des savons et des produits nettoyants sans phosphate;
- O **Limiter l'usure** de ses installations septiques en évitant d'y jeter des produits chimiques;
- O **S'impliquer** auprès de son association/comité de riverains ou contribuer à en créer un;
- O **Inviter** son entourage à poser des gestes concrets pour protéger, restaurer et mettre en valeur les plans et les cours d'eau;

### Code d'éthique nautique

- ☐ Favoriser les produits biodégradables et écologiques.
- ☐ Favoriser l'utilisation de moteur quatre temps, lors de l'achat d'un nouveau moteur pour votre embarcation,
- Laver vos embarcations (à moteur et sans moteur) avant la mise à l'eau, surtout si vous êtes allés sur des plans d'eau différents. Attention à la propagation d'espèces exotiques envahissantes.
- **Circuler** à une vitesse créant le minimum de vagues, surtout à proximité des nageurs ou autres bateaux.
- Limiter la vitesse sur le plan d'eau, surtout en bordure de la rive
- Ne pas créer délibérément des vagues.
- ☐ Préférer un départ et une arrivée perpendiculaires à la rive
- Réduire la production de vagues et de limiter le risque d'accident, limiter la vitesse sur le lac à moins de 5km/h sans vague lorsque vous êtes à moins de 30 m de la rive.
- ☐ **Priorité** aux nageurs et embarcations non motorisées.
- ☐ **Rester loin** des nageurs ou embarcations non motorisées.
- Naviguer en eau profonde, pour les activités nautiques impliquant motomarines, wakeboards ou gros bateaux.
- Respecter les règles et lois de sécurité nautique.
- **Veiller** à la conformité de vos réservoirs d'eaux usées et disposer adéquatement de leur contenu, si c'est le cas.
- Éviter le débordement ou de déverser tout produit polluant dans l'eau (essence, huile), lors du remplissage de votre réservoir à essence.
- Ne pas jeter vos déchets dans l'eau, ni dans le lac et/ou sur le rivage.
- Garder vos ordures jusqu'à ce que vous puissiez les déposer dans le contenant approprié.

Le code d'éthique nautique et la charte de riverain ne remplacent pas les réglementations applicables.

### Biodiversité: les refuges thermiques, une richesse qui vous appartient

En tant que municipalité de tête de bassin, votre rôle quant à la préservation de ces milieux est plus grand que vous ne le croyez.

Imaginez-vous qu'un refuge thermique pour un saumon dans une rivière est l'équivalent pour l'humain d'un oasis dans le désert. Les saumons ont besoin d'une température variant de 7 à 17°C. Au-delà de cette température, les saumons se retrouvent en stress thermique pouvant conduire à des décès, de là l'importance de connaître les refuges thermiques, les comprendre et les protéger.




De par la topographie de votre territoire, des éléments y sont favorables pour le développement de ces refuges thermiques, il est donc bien important de connaître son environnement.


L'image de droite est une photo prise en imagerie thermique de la rivière Ristigouche.

On y voit un panache d'eau froide provenant d'un tributaire. Celui-ci est 7.C plus froid que la rivière!







### Biodiversité: les refuges thermiques, une richesse qui vous appartient



### Biodiversité: espèces exotiques envahissantes (EEE): la berce







15 à 50 rayons © Gouvernement du Québec, 2024

https://www.matapediarestigouche.org/berce-sphondyle

### Biodiversité: espèces exotiques envahissantes (EEE): la berce

#### La berce sphondyle (commune, Heracleum sphondylium)

La berce sphondyle a été introduite au Québec et fut observée pour la première fois en 1958 à Amqui (Rousseau 1968). Sa présence a été confirmée en 2015 dans La Matapédia. Dans l'Est-du-Québec, nous la retrouvons dans les MRC de La Matapédia, d'Avignon, de Bonaventure, de Rimouski-Neigette, de la Mitis et de la Matanie.

Sa sève comporte une toxine qui, en contact avec la peau, la rend photosensible. Une simple exposition au soleil par la suite provoque des lésions semblables à des brûlures plusieurs heures après le contact initial (Lavoie 2019). Le secteur de La Matapédia est celui où il y a le plus de brûlures répertoriées par la berce au Bas-St-Laurent (comm. personnelle CISSS Bas-Saint-Laurent).

La berce sphondyle envahit presque tous les types de milieux. Cette plante envahissante a des propriétés qui lui permettent de coloniser un grand territoire rapidement en prenant la place des espèces locales. Sa présence de plus en plus importante et les brûlures qu'elle cause aux citoyens représentent un frein aux nombreuses activités du territoire.

### → <u>AVIS IMPORTANT:</u> VOTRE MUNICIPALITÉ PEUT ÊTRE SANS BERCE!

Pour parvenir à éradiquer la berce sphondyle, les recommandations suivantes sont à noter:

- Traiter en priorité les colonies isolées. Les traitements sur ces sites ont une efficacité accentuée par l'absence d'influence d'autres colonies. La gestion de la banque de graines dans le sol est aussi plus efficace par cette influence limitée.
- Gérer et traiter les colonies dans les lieux publics. Celles-ci représentent un plus grand risque pour la santé des citoyens par la fréquentation des lieux.
- Utiliser votre machinerie si vous y avez accès. Les traitements à la pelle mécanique, lorsque bien faits, représentent la meilleure solution pour traiter un maximum de superficie.
- Agissez rapidement sur les colonies connues. Lorsque aucune action n'est portée, les colonies vont prendre de l'expansion chaque année. Les efforts de traitements et les coûts augmenteront aussi chaque année pour venir à bout de ces colonies.
- Si vous manquez de ressources humaines ou financières, effectuez des traitements de contrôle (tonte et coupe d'ombelles) qui demandent moins de temps. Ces efforts permettront de limiter l'expansion de l'espèce.
- Il importe de bien nettoyer l'ensemble des équipements utilisés après les traitements dans un souci de santé (éviter les brûlures) et pour éviter de propager des graines sans le vouloir.
- Effectuez de la sensibilisation citoyenne. Il faut permettre à vos citoyens de bien reconnaître la berce sphondyle et de la traiter de façon convenable lorsqu'elle se retrouve sur leur terrain.

Toutes les informations pratiques pour éradiquer la berce dans votre municipalité sont dans votre guide d'accompagnement: Plan d'actions stratégiques Lutte contre la Berce Sphondyle St-Noël



https://www.matapediarestigouche.org/berce-sphondyle

### Changements climatiques: quantité d'eau

| Type d'usage                      | Impacts potentiels  | Éléments de vulnérabilité à considérer  |  |  |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Agricole                          |   | Endommagement des cultures / Perte de sol arable par<br>l'érosion / Difficulté de drainage / Perte des éléments<br>nutritifs  |  |  |
| Urbain                            | Orages violents, crues soudaines plus fréquentes, pluies diluviennes. | Augmentation du ruissellement urbain / Augmentation des apports en sédiments / Augmentation des polluants   |  |  |
| Réseau routier                    | plus frequentes, pluies dituviennes.                                  | Débordement des ouvrages d'évacuation de l'eau /<br>Dommages aux infrastructures sensibles  |  |  |
| Forestier                         |   | Zones sensibles à l'érosion / Dénivelé important dans certaines sections  |  |  |
| Aménagement du<br>territoire      |   | Risques accrus de glissements de terrain (ex: constructions près des rives et dans les zones inondables)  |  |  |
| Pêche                             | Inondations plus fréquentes et/ou<br>plus sévères                     | Débâcle printanière  Changement de la période de pêche / Changement de la période de montaison pour le saumon / Pratique de la pêche plus difficile                                 |  |  |
| Santé                             |   | Risques sur la santé en lien avec les inondations / Apparition de nouveaux vecteurs de maladie  |  |  |
| Agricole                          |   | Perte de rendement pour certaines cultures / Manque d'eau pour certaines cultures et le bétail  |  |  |
| Écosystème aquatique              | Sécheresses plus longues et plus                                      | Affectation de la migration des salmonidés sur les frayères et la population des anguilles d'Amérique   |  |  |
| Approvisionnement en eau potable  | fréquentes  | Manque d'eau dans certaines zones habitées (ex: Parc<br>Parent du Lac-au-Saumon en 2012, manque d'eau en puits<br>privés dans nombreuses municipalités et dans la zone<br>agricole) |  |  |
|                                   | Climat historique   | Climat futur  |  |  |
| Résidentiel 431 19                |   |   |  |  |
| Voirie 385 185 Commercial 285 125 |   |   |  |  |
| Industriel 11563                  | _   | Deve la haccia vargante   |  |  |
| MTQ 103 95                        |   | Pour le bassin versant:<br>Le scénario RCP 8.5 indique  |  |  |
| Institution 96 435                |   | une augmentation moyenne<br>du volume de précipitation et   |  |  |
| Municipal 7107                    | de ruissellement de 17.5% à   |   |  |  |
| Agricole 1663                     |   |   |  |  |
| Voie Ferrée 3555                  |   |   |  |  |

Volume de ruissellement actuel et futur en milliers de m³ par secteur d'activité.

Agroforestier

### Cohabitation avec les milieux aquatiques: forces et défis

Voici vos forces et faiblesses qui peuvent vous orienter dans vos actions en lien avec l'eau

|  | Eau potable et<br>santé humaine   | Eaux usées  | Zone habitée  | Ruissellement   | Biodiversité   |
|--|---|---|---|---|--|
| Forces<br>et/ou<br>opportunités  | <ul> <li>Approvisionnement<br/>souterrain</li> <li>Consommation d'eau<br/>potable adéquate</li> </ul>   | <ul> <li>Réseau d'égout<br/>séparé</li> <li>Relevé sanitaire du<br/>lac Michaud<br/>disponible</li> </ul>   | <ul> <li>Opportunité de gestion de l'eau en tête de bassin</li> <li>Vous vivez à la tête des bassins versants qui séparent le fleuve et la Baie-des-Chaleurs</li> </ul>   | <ul> <li>Bon potentiel de gestion durable des eaux de pluie à plusieurs endroits en milieu habité et résidentiel</li> <li>Bon drainage des sols</li> </ul>  | <ul> <li>Plusieurs tourbières<br/>boisées</li> <li>Rivière Tartigou bande<br/>riveraine bien protégée<br/>et végétalisée</li> </ul>  |
| Faiblesses<br>et/ou défis  | <ul> <li>Eaux souterraines vulnérables</li> <li>Plusieurs puits d'eau potable sont à proximité de fosses septiques et dans des aires de vulnérabilité moyenne</li> <li>Aucun inventaire des puits privés</li> <li>Manque de connaissance sur la nappe phréatique</li> <li>Puits municipaux à proximité de terres agricoles et routes (périmètre virologique)</li> </ul> | <ul> <li>Présence de nuisance directe et indirecte au lac Michaud</li> <li>Aucun inventaire de fosses septiques pour le reste de St-Noël</li> </ul> | <ul> <li>Pentes fortes sur certaines routes</li> <li>Aucune caractérisation des bandes riveraines pour Tartigou</li> <li>Présence de terrains contaminés réhabilités</li> <li>Zone industrielle légère près de la Tartigou</li> <li>Linéarisation importante de certains cours d'eau</li> </ul> | <ul> <li>Presque l'ensemble des aires de drainage se draine directement ou indirectement dans la rivière Tartigou</li> <li>Quelques zones problématiques identifiées à gérer</li> <li>Plusieurs canalisation de ruisseau sous les routes et terrains</li> <li>Rejets d'hydrocarbures observés à l'émissaire pluvial #4</li> </ul> | <ul> <li>Vigile: expansion de<br/>la berce sur le<br/>territoire via la voirie</li> <li>Potentiel non<br/>exploité pour<br/>augmenter la<br/>biodiversité avec les<br/>terrains résidentiels</li> <li>Lac Michaud<br/>susceptible à la<br/>moule zébrée</li> </ul> |
| Lien avec les<br>problématiques<br>prioritaires du<br>Plan Directeur<br>de l'Eau | Fiche problématique:<br>Qualité et quantité<br>d'eau  | Fiche problématique:<br>Oualité et quantité<br>d'eau  | Fiche problématique:  Dégradation des milieux humides et hydriques  | Fiche<br>problématique:<br>Sédimentation  | Fiche problématique:<br>Dégradation des<br>habitats fauniques<br>aquatiques  |

### PDE: problématiques prioritaires et leurs orientations

Depuis 2004, la table de concertation de l'OBVMR a élaboré, en concertation avec les divers secteurs d'activités du bassin versant, le PDE. Afin d'inclure tous les types d'usages de la ressource eau, des rencontres sectorielles ont permis de définir les problématiques prioritaires, les orientations, les objectifs et les pistes d'actions. De manière évolutive, les avancements ont été présentés pour approbation globale à la table de concertation de l'OBVMR.

Vous connaissez mieux maintenant les perturbations écologiques de votre zone urbaine ainsi que les potentiels de richesses écologiques. Dans cette section, nous allons faire le lien entre les perturbations observées et les orientations élaborées dans le Plan Directeur de l'Eau pour le secteur municipal.

### Dégradation de l'habitat

### 20.11. Réduire les pressions du secteur forestier dans le bvr.

- 20.12. Réduire les pressions du secteur agricole pour le bvr.
- 20.13. Avoir un inventaire des habitats (fosses, frayères, aires d'alevinage) des poissons
- 20.14. Améliorer les habitats et les stocks piscicoles.
- 20.16. Dresser le portrait des espèces exotiques et envahissantes menaçants les MHH pour le bvr.
- 20.17. Avoir des mesures de lutte et de contrôle des EEE pour le bvr menaçant les MHH.
- 20.18: Maintenir les refuges thermiques aquatiques pour les espèces bioindicatrices de la qualité de l'eau que sont les salmonidés.

### Conflits d'usage

- 10.4. Assurer la qualité de l'eau pour les activités nautiques pour le byr.
- 20.15. Améliorer l'éthique de pêche
- 30.1. Favoriser la sécurité nautique pour le bvr.
- 50.1. Sensibiliser les citoyens, les municipalités, les industries, les commerces et les institutions à l'importance et aux avantages économiques de l'utilisation responsable de l'eau.
- 50.2. Créer un lien d'appartenance et de cohabitation durable avec les plans d'eau.

### Qualité de l'eau

- 10.1. Améliorer la vigilance citoyenne par rapport aux réseaux privés et aux puits pour le byr.
- 10.2. Améliorer nos connaissances sur les nappes phréatiques.
- 10.3. Protéger les aires d'alimentation d'eau privées et publiques.
- 20.7. Améliorer la gestion des systèmes de bassins d'épuration et/ou des étangs de rétention dans le bvr.
- 20.8. Améliorer la gestion des installations septiques individuelles.

### Dégradation des milieux humides et hydriques

- 20.10 Réduire l'impact de la voirie et de la construction sur les habitats aquatiques dans le byr.
- 20.3. Optimiser les fonctions écologiques des MHH pour le bvr.
- 20.6. Réduire l'impact des dépôts de neiges usées sur les plans d'eau pour le bvr.
- 20.9. Réduire les sources de contaminants des autres usages
- 40.1. Limiter le brassage des sédiments.

#### Érosion

- 20.1. Améliorer les connaissances sur les bandes riveraines pour le byr.
- 20.4. Réduire les pressions des milieux habités sur la bande riveraine pour le bvr.
- 30.3. Prévenir les problématiques engendrées lors des crues pour le byr.

#### Sédimentation

- 20.5. Réduire l'impact des milieux habités sur les milieux humides et hydriques pour le byr
- 40.2. Réduire l'apport des sédiments des différentes voies d'accès directes à l'eau

### Orientations présentes dans plusieurs problématiques

- -Dégradation de l'habitat
- -Qualité de l'eau
- -Sédimentation
- 40.3. Diminuer les impacts des activités récréotouristiques à proximité des plans d'eau pour le bvr.
- -Dégradation de l'habitat-Dégradation des milieux
- -Dégradation des milieux humides et hydriques
- 20.2. Améliorer les connaissances de l'état des écosystèmes aquatiques

# NOTES

